PARTICELLA 1n

Tipo forestale	AN12X
Tipo strutturale	CCA
Intervento	CF
Priorità	B
% ripresa	50
Età	23
G/ha	15
Num. piante /ha > 5cm	835
Vol/ha (mc/ha)	96
Necromassa in piedi (mc/ha)	7
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	48
Ripresa totale (mc)	14
Superficie (ha)	0.29

MAPPALE	ETTARI
490	0,29
Totale complessivo	**0,29**

ETTARI		
PRIORITA'	AN12X	Totale complessivo
BREVE (B)	0,29	0,29
Totale complessivo	**0,29**	**0,29**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc		
PRIORITA'	AN12X	Totale complessivo
BREVE (B)	14	14
Totale complessivo	**14**	**14**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo nord	N	1n	Alneto Rabengo	Privato	0,29	Fondovalle Rabengo	Alneto di ontano nero in formazione lineare lungo le sponde del rio Rabengo. Ceduo adulto, a tratti eccessivamente fitto.	Gestione a governo misto con diradamento di alcune ceppaie per permettere alla luce di entrare e non ridurre la capacità pollonifera, e mantenimento di alcuni esemplari più stabili. Asportazione di quasi il 50% della massa presente **in deroga al Regolamento Forestale** per mantenere le ceppaie vitali, altrimenti perderanno la capacità pollonifera e il popolamento andrà verso il collasso. Intervenire con tagli su tratti brevi della sponda.	Trattore	Habitat prioritario. Presenti cavità picidi.

PARTICELLA 1p

Tipo forestale	QV51X	QV51X	QC42C	RB10B	RB10B	BS31X	BS40A	RB10B	RB10B	QC42C	CA40X	CA40X	CA40X	BS40A
Tipo strutturale	GMI	GMI	FMM	GME	GME	FDI	SDD	GME	GME	FDI	CCA	GMI	GMI	SDD
Intervento	DR	DR	SC	CF	CF	CC	NG	CF	CF	SC	CM	CF	CF	NG
Priorità	B	B	D	B	D	T	N	B	T	M	B	B	B	N
% ripresa	30	30	25	50	50	15		50	50	25	60	60	60	
Età	17-50	45-85	75-100	35	35	40-80	40-80	20	20	55-100	30	57	43	
G/ha	19	25	19	14	16	22		17	18	24	38	15	25	
Num. piante /ha > 5cm	2931	1886	226	1599	1711	1023		1425	1517	1586	1365	1376	660	
Vol/ha (mc/ha)	108	215	203	104	111	140		122	129	208	330	121	224	
Necromassa in piedi (mc/ha)	11	14	5	40	43	13		4	4	40	67	51	60	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	33	64	51	52	56	21		61	65	52	198	73	137	
Ripresa totale (mc)	27	13	45	50	72	8		42	42	50	234	71	2	
Superficie (ha)	0.83	0.20	0.89	0.96	1.29	0.37	1.62	0.69	0.65	0.95	1.18	0.97	0.02	0.36

ETTARI							
PRIORITA'	BS31X	BS40A	CA40X	QC42C	QV51X	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)			2,17		1,03	1,65	4,85
MEDIA (M)				0,95			0,95
DIFFERIBILE (D)				0,89		1,29	2,18
INDIFFERENTE (T)	0,37					0,65	1,02
NESSUNA (N)		1,98					1,98
Totale complessivo	**0,37**	**1,98**	**2,17**	**1,84**	**1,03**	**3,60**	**10,99**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc							
PRIORITA'	BS31X	BS40A	CA40X	QC42C	QV51X	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)			307		40	93	440
MEDIA (M)				50			50
DIFFERIBILE (D)				45		72	118
INDIFFERENTE (T)	8					42	50
NESSUNA (N)							
Totale complessivo	**8**		**307**	**95**	**40**	**207**	**657**

MAPPALE	ETTARI
1	0,03
2	0,37
3	0,21
4	1,00
5	0,31
7	0,07
8	0,09
9	0,26
10	0,16
11	0,06
12	0,03
13	0,37
15	0,32
16	0,26
17	0,09
18	0,26
19	0,12
20	0,10
21	0,12
23	0,29
24	0,27
25	0,01
352	0,48
372	0,46
391	0,37
403	0,19
426	0,53
446	0,24
447	0,34
490	3,54
Totale complessivo	**10,99**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo nord	P	1p	Sant'Emiliano Rabengo	Privati vari	10,99	Crinale e vallone che da Sant'Emiliano scendono verso il Rio Rabengo	L'alto versante è caratterizzato a nord ovest da querco-carpineti con buona struttura e fertilità, con piante dai 45 ai 100 anni, sui versanti nord prevalgono le formazioni a castagno (cedui invecchiati o a governo misto) prossime al collasso. Nella conca sui versanti caldi sabbiosi i robinieti si presentano deperienti. Presso il crinale (particelle catastali 446 e 447) sono presenti querceti di rovere giovani a governo misto. La fascia bassa del versante è per la gran parte interessata da noccioleti succeduti al collasso di farnie isolate.	Sui querco-carpineti tagli a scelta con un'incidenza del 25% sulla massa volti a favorire le specie sporadiche. Sui querceti di rovere giovani diradamenti per miglioramento strutturale sul 30% della massa. Castagneti: ceduazione o gestione del governo misto con ringiovanimento delle ceppaie e salvaguardia della rovere e delle altre latifoglie sporadiche. Sui robinieti ceduazione della robinia con rilascio di tutte le altre specie. Sui corileti del basso versante eventuali cure colturali per favorire la rinnovazione di querce e altre latifoglie nobili.	Verricello dall'alto o avvallamento dal fondovalle	Querco-carpineto presso la strada Sant'Emiliano con buone caratteristiche di composizione e struttura, diffusi microhabitat su alberi grandi. Tane nel terreno nelle vallecole in esposizione ovest. Fossili affioranti nelle aree sabbiose degli impluvi.

PARTICELLA 2

Tipo forestale	QV51X	QC42C	RB10B	RB10B	QV51X	CA40X	QV51X	BS40A
Tipo strutturale	GMI	FMM	GME	GME	GMI	GMI	FMA	SDD
Intervento	DR	SC	CF	CF	DR	CF	DR	NG
Priorità	B	D	D	B	M	B	T	N
% ripresa	30	25	50	50	25	60	30	
Età	45-85	75-100	35	20	55	43	50-100	
G/ha	25	17	15	16	20	25	29	
Num. piante /ha > 5cm	1886	201	1676	1357	456	654	521	
Vol/ha (mc/ha)	213	180	108	117	190	226	277	
Necromassa in piedi (mc/ha)	14	4	42	3	19	60	13	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	64	45	54	58	48	136	83	
Ripresa totale (mc)	53	23	42	16	34	315	77	
Superficie (ha)	0.83	0.51	0.78	0.28	0.71	2.32	0.93	1.32

MAPPALE	ETTARI
36	7,68
Totale complessivo	**7,68**

ETTARI						
PRIORITA'	BS40A	CA40X	QC42C	QV51X	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)		2,32		0,83	0,28	3,44
MEDIA (M)				0,71		0,71
DIFFERIBILE (D)			0,51		0,78	1,28
INDIFFERENTE (T)				0,93		0,93
NESSUNA (N)	1,32					1,32
Totale complessivo	**1,32**	**2,32**	**0,51**	**2,48**	**1,06**	**7,68**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc						
PRIORITA'	BS40A	CA40X	QC42C	QV51X	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)		315		53	16	385
MEDIA (M)				34		34
DIFFERIBILE (D)			23		42	65
INDIFFERENTE (T)				77		77
NESSUNA (N)						
Totale complessivo		**315**	**23**	**165**	**58**	**561**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo nord	N	2	Monfalcone versante Rabengo	Incisa della Rocchetta Giovanni	7,68	Versante accidentato fra Monfalcone e Rio Rabengo esposizione ovest	Gli alti versanti in esposizione sud sono caratterizzati da querceti di rovere con cerro, in parte di origine agamica, e presenza di robinia olmo e ciliegio nel piano dominato. I popolamenti presentano numerose piante instabili o filate e stanno andando verso il collasso. I castagneti presenti nelle parti nord dei versanti sono in piena fase di collasso con presenza di molta necromassa a terra ma anche in piedi. Si tratta di cedui invecchiati, con più di 40 anni, in forte deperimento. Diffuso il cancro del castagno. Il robinieto di medio versante, quando presente, su substrati poveri, si presenta come ceduo parzialmente collassato con matricinatura di farnia e rovere. Nei bassi versanti compaiono il querco-carpineto maturo e, nelle aree collassate, il noccioleto con latifoglie (querce, pioppo canescente, pioppo bianco). La farnia presenta discreta vigoria e sono presenti piante instabili.	Sui querceti di rovere è necessaria una destrutturazione dei popolamenti, con diradamenti irregolari a favore dei soggetti più stabili e per favorire la rinnovazione già affermata di querce castagno ciliegio orniello presente soprattutto nelle buche. I tagli, con una ripresa del 30%, devono comprendere la ceduazione del nocciolo per permettere l'ingresso della luce. Per i cedui di castagno si prevede la gestione a governo misto con ceduazione della maggior parte delle ceppaie e l'asportazione del materiale secco incidendo su circa il 60% della massa. Per i robinieti, trattati a governo misto, si prevede l'asportazione del 50% della massa, a carico soprattutto della robinia e rilasciando le latifoglie mesofile presenti. Nel querco-carpineto si prevede un taglio a scelta colturale, con asportazione degli esemplari instabili, per favorire la rinnovazione affermata. La ripresa prevista è del 25% sulla massa.	Verricello dall'alto o avvallamento dal fondovalle. Possibile ripristino vecchi tracciati MP per il passaggio di piccoli cingolati.	Presenti cavità picidi e gallerie di insetti nel querco-carpineto. Portaseme di rovere. Individuato faggio nello strato arbustivo. Ottimo habitat di sottobosco nel querco-carpineto.

PARTICELLA 3f

Tipo forestale	**RB10X**
Tipo strutturale	CCG
Intervento	NG
Priorità	N
% ripresa	
Età	
G/ha	
Num. piante /ha > 5cm	
Vol/ha (mc/ha)	
Necromassa in piedi (mc/ha)	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	
Ripresa totale (mc)	
Superficie (ha)	0.15

MAPPALE	ETTARI
492	0,15
Totale complessivo	**0,15**

ETTARI		
PRIORITA'	RB10X	Totale complessivo
NESSUNA (N)	0,15	0,15
Totale complessivo	**0,15**	**0,15**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc		
PRIORITA'	RB10X	Totale complessivo
NESSUNA (N)		
Totale complessivo		

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo nord	F	3f	Area attrezzata Rabengo	Privato	0,15	Fondovalle Rabengo presso area attrezzata	Ceduo giovane di robinia in area pianeggiante presso l'area attrezzata.	Nessun intervento nell'arco dei 15 anni di durata del presente Piano per favorire l'invecchiamento del popolamento. Interventi futuri saranno volti al contenimento ed alla eliminazione della robinia.		

PARTICELLA 3p

Tipo forestale	QC42C	RB10B	RB10B	RB10B	RB10X	RB10B	RB10B	RB10X	CA40X	QC42X	QV51X	RB10B	RB10X	BS31X
Tipo strutturale	FMM	GMC	0	SDD	GMI	GMC	GMI	GMI	CCA	FMM	FMA	SDD	CCG	FDG
Intervento	SC	CF	0	NG	CF	CF	CF	CF	CM	SC	DR	NG	NG	NG
Priorità	D	B	D	N	T	M	B	T	B	B	T	N	N	N
% ripresa	25	50	50	50	50	50	50	50	50	25	30			
Età	75-100	23	23	23	23	35-70	35-70	35-70	55	60-100	50-100			
G/ha	20	18	18	0	17	23	23	24	32	25	29			
Num. piante /ha > 5cm	243	1318	1334	0	1225	1080	1085	1113	1216	942	521			
Vol/ha (mc/ha)	220	133	134	0	122	175	176	182	286	285	278			
Necromassa in piedi (mc/ha)	5	40	40	0	37	86	87	89	58	0	13			
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	55	67	68	0	62	88	88	90	143	71	83			
Ripresa totale (mc)	5	92	197	0	16	44	122	22	110	23	106			
Superficie (ha)	0.09	1.37	2.91	0.88	0.26	0.50	1.38	0.24	0.77	0.32	1.27	0.05	0.37	0.95

MAPPALE	ETTARI
353	0.45
359	0.31
399	0.19
41	1.40
42	1.36
43	0.13
439	0.17
44	1.35
45	0.26
46	0.09
47	0.26
48	0.34
49	0.38
490	0.01
491	0.18
492	0.26
495	0.88
50	0.49
51	0.49
52	0.40
53	0.02
54	0.32
55	0.26
56	0.10
57	0.78
60	0.29
61	0.19
Totale comple	**11.36**

ETTARI								
PRIORITA'	BS31X	CA40X	QC42C	QC42X	QV51X	RB10B	RB10X	Totale complessivo
BREVE (B)		0.77		0.32		2.75		3.85
MEDIA (M)						0.50		0.50
DIFFERIBILE (D)			0.09			2.91		3.00
INDIFFERENTE (T)					1.27		0.50	1.78
NESSUNA (N)	0.95					0.92	0.37	2.24
Totale complessivo	**0.95**	**0.77**	**0.09**	**0.32**	**1.27**	**7.09**	**0.87**	**11.36**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc								
PRIORITA'	BS31X	CA40X	QC42C	QC42X	QV51X	RB10B	RB10X	Totale complessivo
BREVE (B)		110		23		213		347
MEDIA (M)						44		44
DIFFERIBILE (D)			5			197		202
INDIFFERENTE (T)					106		38	144
NESSUNA (N)	0					0	0	0
Totale complessivo	**0**	**110**	**5**	**23**	**106**	**454**	**38**	**736**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo nord	P	3p	C. Malacarne Rabengo	Privati	11,36	Vallone sotto C. Malacarne verso Rabengo	Gli alti e medi versanti in varia esposizione sono occupati da robinieti cedui con presenza di orniello, e querceto mesoxerofilo rado. Generalmente son o popolamenti parzialmente collassati in cui è presente una parte di rinnovazione di specie autoctone. Il castagneto presente su un versante nord è un ceduo invecchiato, deperiente, vicino alla fase di crollo, con presenza di poche latifoglie autoctone. Molto diffusi il cancro corticale e il cinipide galligeno. Nelle fasce basse di scarpata verso il Rabengo sono presenti querco-carpineti adulti con buona presenza di nocciolo. Nella valletta secondaria a monte dell'area attrezzata è presente una boscaglia con alcuni pioppi neri e con file di pioppo ibrido.	Sui robinieti si prevede la gestione a governo misto ed il taglio della robinia per favorire gli individui più stabili della rinnovazione affermata di latifoglie mesofile. Prelievi previsti per il 50% della massa. Sul castagneto deperiente si prevede l'asportazione del 50% della massa a carico delle ceppaie instabili di castagno, e rilasciando tutte le altre latifoglie mesofile e i castagni meno deperienti a gruppi. Tagli a scelta sui querco-carpineti con individuazione degli esemplari più stabili ed asportazione del 25% della massa. Nella boscaglia di fondovalle non si prevedono interventi salvo l'eventuale asportazione di piante secche.	Verricello dall'alto o trattore dal fondovalle	Cavità picidi. Dendrotelmi, cavità nei contrafforti radicali.

PARTICELLA 4f

Tipo forestale	QV51X	SP30X
Tipo strutturale	FDI	FDG
Intervento	SC	NG
Priorità	M	N
% ripresa	25	
Età	85	
G/ha	26	
Num. piante /ha > 5cm	735	
Vol/ha (mc/ha)	293	
Necromassa in piedi (mc/ha)	5	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	72	
Ripresa totale (mc)	4	
Superficie (ha)	0.06	0.12

MAPPALE	ETTARI
375	0,18
Totale complessivo	**0,18**

ETTARI			
PRIORITA'	QV51X	SP30X	Totale complessivo
MEDIA (M)	0,06		0,06
NESSUNA (N)		0,12	0,12
Totale complessivo	**0,06**	**0,12**	**0,18**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc			
PRIORITA'	QV51X	SP30X	Totale complessivo
MEDIA (M)	4		4
NESSUNA (N)			
Totale complessivo	**4**		**4**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo nord	F	4f	Area attrezzata Rabengo Area attrezzata parcheggio	Eredi Incisa della Rocchetta Mario	0,18	Fondovalle Rabengo presso area attrezzata, Fascia boscata attorno al parcheggio sul crinale	La porzione in fondovalle, presso l'area attrezzata Rabengo, è caratterizzata da un pioppeto di pioppo nero, con nocciolo e equiseto iemale nelle parti più umide. La parte di crinale, che fa da cornice al parcheggio, è invece una fustaia disetanea irregolare di rovere adulto interessato nel 2017 da tagli a carico degli esemplari più instabili per garantire la sicurezza della fruizione dell'area. Il popolamento si presenta ancora discretamente troppo fitto.	Non si prevedono interventi sul pioppeto. Sul querceto di rovere si prevedono tagli a scelta con asportazione del 25% della massa, per favorire l'accrescimento radiale degli esemplari più stabili.	Verricello	Equiseto iemale nel fondovalle umido presso l'area attrezzata Rabengo.

PARTICELLA 4n

Tipo forestale	AN12X	RB10B	QV51X	CA40X	QC42X	BS31X
Tipo strutturale	CCA	GMC	FDI	CCA	FMM	FDG
Intervento	CF	CF	SC	CM	SC	NG
Priorità	B	D	N	B	B	N
% ripresa	50	50	25	50	25	
Età	23	23	85	55	60-100	
G/ha	19	18	0	32	25	
Num. piante /ha > 5cm	1044	1320	0	1216	923	
Vol/ha (mc/ha)	121	133	0	284	277	
Necromassa in piedi (mc/ha)	9	40	0	58	0	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	60	67	0	143	69	
Ripresa totale (mc)	12	46	0	4	84	
Superficie (ha)	0.21	0.69	2.47	0.03	1.21	0.05

MAPPALE	ETTARI
73	0,31
375	4,35
Totale complessivo	**4,66**

ETTARI							
PRIORITA'	AN12X	BS31X	CA40X	QC42X	QV51X	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)	0.21		0.03	1.21			1.45
DIFFERIBILE (D)						0.69	0.69
NESSUNA (N)		0.05			2.47		2.52
Totale complessivo	**0.21**	**0.05**	**0.03**	**1.21**	**2.47**	**0.69**	**4.66**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc							
PRIORITA'	AN12X	BS31X	CA40X	QC42X	QV51X	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)	12		4	84			100
DIFFERIBILE (D)						46	46
NESSUNA (N)		0			0		0
Totale complessivo	**12**	**0**	**4**	**84**	**0**	**46**	**147**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo nord	N	4n	Vallone area attrezzata Rabengo	Eredi Incisa della Rocchetta Mario	4,66	Vallone versante Rabengo presso area attrezzata fino a versante a sud della C. Malacarne	L'alto versante è caratterizzato da un querco-carpineto già oggetto di diradamenti pregressi (misura I7 del PSR), ma ancora troppo fitto per permettere un buon sviluppo laterale degli esemplari. Presenza a tratti massiccia di orniello nel piano dominato e di esemplari di cerro in quello dominante. Sul medio versante a monte dell'area attrezzata è presente un ceduo di robinia e orniello in fase di collasso con rovere roverella e cerro nel piano dominante. Le fasce inferiori sono interessate da fustaie mature e fitte di farnia con sottobosco di nocciolo e presenza di robinia. Lungo il Rabengo è presente una piccola porzione di ceduo maturo di ontano nero. La parte più a nord comprende una boscaglia di fondovalle con pioppi ibridi e qualche esemplare di pioppo nero e noccioli.	Sui querco-carpineti tagli a scelta con un'incidenza del 25% sulla massa volti a favorire le specie sporadiche, tra cui il ciavardello, e la rinnovazione presente. I tagli devono anche interessare l'orniello in fase di forte diffusione. Sul robinieto si prevede la gestione a governo misto ed il taglio della robinia per favorire gli individui più stabili della rinnovazione affermata di latifoglie mesofile. Prelievi previsti sul 50% della massa. Sulla farnia di fondovalle si prevede un prelievo del 25% rilasciando gli esemplari più stabili. L'alneto è da gestire come un governo misto, con taglio di alcune ceppaie per conservare la capacità pollonifera e il mantenimento ed invecchiamento di esemplari stabili. Nella boscaglia non sono previsti interventi.	Verricello dall'alto e trattore nel fondovalle	L'alneto è habitat prioritario. Cavità picidi nel querco-carpineto. Portaseme di farnia.

PARTICELLA 5

Tipo forestale	AN12X	QC60B	QC42X	BS40X
Tipo strutturale	CCA	GME	FDI	FGI
Intervento	CF	CF	SC	NG
Priorità	B	T	B	N
% ripresa	50	50	25	
Età	23	47	60-100	
G/ha	19	16	25	
Num. piante /ha > 5cm	1044	636	939	
Vol/ha (mc/ha)	139	141	284	
Necromassa in piedi (mc/ha)	9	29	0	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	60	70	70	
Ripresa totale (mc)	1	144	30	
Superficie (ha)	0.02	2.05	0.43	1.58

MAPPALE	ETTARI
70	0,55
71	0,65
354	0,11
362	0,64
64	0,20
65	0,25
67	0,78
68	0,79
69	0,10
Totale complessivo	**4,08**

ETTARI					
PRIORITA'	AN12X	BS40X	QC42X	QC60B	Totale complessivo
BREVE (B)	0,02		0,43		0,45
INDIFFERENTE (T)				2,05	2,05
NESSUNA (N)		1,58			1,58
Totale complessivo	**0,02**	**1,58**	**0,43**	**2,05**	**4,08**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc					
PRIORITA'	AN12X	BS40X	QC42X	QC60B	Totale complessivo
BREVE (B)	1		30		31
INDIFFERENTE (T)				144	144
NESSUNA (N)					
Totale complessivo	**1**		**30**	**144**	**175**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo sud	P	5	Versante Case Iabergo (S. Carlo)	Privati	4,08	Versante esposto a ovest a monte della confluenza fra il Rio Rabengo e il vallone della Gisverga	L'alto versante in esposizione ovest è caratterizzato da un ex robinieto collassato che ha lasciato il posto a un querco-carpineto mesoxerofilo con orniello. In alcune aree si tratta di un bosco di invasione a farnia robinia orniello e olmo su ex vigneti, già ceduato circa 45 anni fa. Verso nord, nella fascia inferiore, si trasforma in una fustaia irregolare di querce miste su sabbie astiane, con età variabile tra 60 e 100 anni. Nella fascia di fondovalle esposta ad ovest la quercia collassa e lascia il posto ad un noccioleto con grosse e dense ceppaie. Nella porzione nord, lungo il Rabengo, è presente una piccola porzione di ceduo maturo di ontano nero.	Nel querco-carpineto dell'alto versante si prevede una ripresa del 50% della massa con gestione del governo misto, sgombero della robinia e degli altri esemplari instabili (ornielli). Nel querceto su sabbie la ripresa sarà del 25% con scelta dei candidati più stabili. Per il noccioleto non si prevedono interventi. L'alneto è da gestire come un governo misto, con taglio di alcune ceppaie per conservare la capacità pollonifera e il mantenimento ed invecchiamento di esemplari stabili.	Verricello dall'alto o trattore	L'alneto è habitat prioritario. Cavità picidi nel querco-carpineto.

PARTICELLA 6

Tipo forestale	QV51X	QV51X	QC42X
Tipo strutturale	FDI	FDI	FDI
Intervento	NG	SC	SC
Priorità	N	B	B
% ripresa		25	25
Età	>80	80	60-100
G/ha		32	26
Num. piante /ha > 5cm		567	961
Vol/ha (mc/ha)		352	294
Necromassa in piedi (mc/ha)		10	0
Ripresa ad ettaro (mc/ha)		88	72
Ripresa totale (mc)		159	1
Superficie (ha)	3.38	1.80	0.01

MAPPALE	ETTARI
75	0.27
373	2.69
374	1.54
376	0.69
Totale complessivo	**5.19**

ETTARI			
PRIORITA'	QC42X	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)	0.01	1.80	1.81
NESSUNA (N)		3.38	3.38
Totale complessivo	**0.01**	**5.18**	**5.19**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc			
PRIORITA'	QC42X	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)	1	159	160
NESSUNA (N)			
Totale complessivo	**1**	**159**	**160**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo sud	N	6	Versante S. Carlo	Eredi Incisa della Rocchetta Mario	5,19	Versante esposto a est della Val Gisverga	L'alto versante in esposizione est è caratterizzato da un querceto di rovere con cerro e qualche farnia, con carpino bianco nel piano inferiore. La parte di testa della Val Gisverga non ha subito interventi negli ultimi decenni e presenta querce con grossi diametri, numerose piante ribaltate ed edera di grandi dimensioni. La parte più settentrionale del versante, ove compare l'orniello nel piano inferiore, è una fustaia irregolare abbastanza densa di rovere orniello e carpino. Nella punta settentrionale è presente un piccolo querceto misto che si estende verso le quote inferiori del fondovalle. Si tratta di una fustaia irregolare di 60-100 anni.	Nel querceto di rovere della parte alta non si prevedono interventi, salvo l'asportazione di qualche esemplare morto, e si prevede evoluzione controllata. Nella parte settentrionale si prevede un taglio a scelta, con asportazione del 25% della massa, riducendo la densità del piano dominante e nello stesso tempo favorendo le latifoglie autoctone più stabili già presenti. Nel querceto su sabbie astiane la ripresa sarà del 25% con scelta dei candidati più stabili.	Verricello dall'alto e trattore	Cavità picidi nel querco-carpineto, nidi, piante di grosse dimensioni, piante ribaltate con sviluppata biodiversità. Portaseme di carpino.

PARTICELLA 7

Tipo forestale	QV51C	QV51X	QV51X	QC42X	BS40X
Tipo strutturale	FDI	FDI	FDI	FDI	GMI
Intervento	SC	SC	SC	SC	CC
Priorità	T	B	B	B	T
% ripresa	25	25	25	25	15
Età	85	85	80	60-100	40-80
G/ha	21	22	31	26	21
Num. piante /ha > 5cm	1105	1139	554	961	961
Vol/ha (mc/ha)	195	202	344	289	131
Necromassa in piedi (mc/ha)	6	6	10	0	12
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	49	51	86	72	20
Ripresa totale (mc)	18	101	45	127	48
Superficie (ha)	0.37	1.98	0.53	1.77	2.42

MAPPALE	ETTARI
72	4.28
75	0.57
373	0.44
374	1.77
Totale complessivo	**7.06**

ETTARI					
PRIORITA'	BS40X	QC42X	QV51C	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)		1.77		2.51	4.27
INDIFFERENTE (T)	2.42		0.37		2.78
Totale complessivo	**2.42**	**1.77**	**0.37**	**2.51**	**7.06**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc					
PRIORITA'	BS40X	QC42X	QV51C	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)		127		146	273
INDIFFERENTE (T)	48		18		66
Totale complessivo	**48**	**127**	**18**	**146**	**339**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo sud	N	7	Val Gisverga	Eredi Incisa della Rocchetta Mario e Oddone	7,06	Parte bassa dei versanti est e ovest della Val Gisverga	Il versante in esposizione ovest è caratterizzato da un querceto di rovere con cerro e orniello con molta necromassa a terra e buona componente di rinnovazione, anche di ciavardello. La rovere è in forte deperimento a discapito del cerro, mentre nel piano inferiore l'orniello ha un buon sviluppo. Sul versante in esposizione est il querceto di farnia su sabbie astiane presenta molto nocciolo soprattutto verso il fondovalle più umido, dove compare anche la robinia. Il popolamento principale ha età 60-100 anni. Nella parte bassa della Val Gisverga, come nella parte di testa, è presente un corileto con individui isolati di quercia del popolamento originario ormai collassato. Discreta la presenza di rinnovazione di latifoglie mesofile.	Sia nel querceto di rovere, sia in quello di farnia, si prevede un taglio a scelta con asportazione del 25% della massa favorendo le piante più stabili e la rinnovazione. Dove è presente molto nocciolo si prevede il taglio delle ceppaie per favorire l'ingresso della luce necessaria alla rinnovazione. Nei popolamenti a maggioranza di nocciolo si prevede la ceduazione dello stesso con interventi puntuali, per favorire la sementazione di farnia e carpino e la rinnovazione affermata di latifoglie mesofile. L'intervento, che prevede l'asportazione del 15% della massa, sarà a macchiatico negativo.	Verricello dall'alto e trattore	Cavità picidi nel querco-carpineto, nidi. portaseme di tiglio, acero campestre, carpino, castagno.

PARTICELLA 8f

Tipo forestale	QV51X
Tipo strutturale	FDI
Intervento	SC
Priorità	M
% ripresa	25
Età	45-85
G/ha	30
Num. piante /ha > 5cm	777
Vol/ha (mc/ha)	331
Necromassa in piedi (mc/ha)	13
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	83
Ripresa totale (mc)	11
Superficie (ha)	0.13

MAPPALE	ETTARI
72	0.13
Totale complessivo	**0.13**

ETTARI		
PRIORITA'	QV51X	Totale complessivo
MEDIA (M)	0.13	0.13
Totale complessivo	**0.13**	**0.13**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc		
PRIORITA'	QV51X	Totale complessivo
MEDIA (M)	11	11
Totale complessivo	**11**	**11**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo sud	F	8f	Area attrezzata parcheggio	Eredi Incisa della Rocchetta Oddone	0,13	Fascia boscata attorno al parcheggio sul crinale	Fustaia disetanea irregolare adulta di rovere e cerro con orniello nel piano dominato, interessata nel 2017 da tagli a carico degli esemplari più instabili per garantire la sicurezza della fruizione dell'area. Il popolamento si presenta ancora discretamente troppo fitto. La rovere deperiente sta lasciando il posto al cerro.	Si prevedono tagli a scelta con asportazione del 25% della massa, per favorire l'accrescimento radiale degli esemplari più stabili.	Verricello	Buona presenza di cerro. Portaseme di cerro.

PARTICELLA 8n

Tipo forestale	QV51X	QV51X	CA40X	RB10B	QV51X
Tipo strutturale	FDI	FDI	CCI	GMC	FDI
Intervento	SC	SC	CF	CF	SC
Priorità	B	M	B	B	M
% ripresa	30	25	50	50	25
Età	17-50	45-85	55	35	80
G/ha	21	30	31	16	20
Num. piante /ha > 5cm	3274	777	1179	1729	782
Vol/ha (mc/ha)	120	331	275	112	200
Necromassa in piedi (mc/ha)	12	13	56	43	7
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	36	83	138	56	50
Ripresa totale (mc)	28	103	90	31	133
Superficie (ha)	0.78	1.24	0.65	0.55	2.66

MAPPALE	ETTARI
72	5.87
Totale complessivo	**5.87**

ETTARI				
PRIORITA'	CA40X	QV51X	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)	0.65	0.78	0.55	1.97
MEDIA (M)		3.90		3.90
Totale complessivo	**0.65**	**4.68**	**0.55**	**5.87**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc				
PRIORITA'	CA40X	QV51X	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)	90	28	31	148
MEDIA (M)		236		236
Totale complessivo	**90**	**264**	**31**	**384**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo sud	N	8n	alta Val Gisverga	Eredi Incisa della Rocchetta Oddone	5,87	Lungo l'asfaltata di crinale nord-sud, lato ovest	Fustaia disetanea irregolare adulta di rovere, localmente con cerro nello strato dominante, e presenza più o meno affermata di olmo, orniello e ciavardello nello strato dominato. Età 45-85 anni; nella parte più a sud il popolamento si presenta più giovane (15-50 anni). La rovere si presenta discretamente vitale, mentre l'orniello sta diffondendosi nello strato dominato. La rinnovazione di quercia è localmente compromessa dal brucamento dei selvatici. A valle del parcheggio è presente un ceduo di castagno deperiente, vicino alla fase di crollo. A sud, in esposizione sud-ovest, è presente un ceduo di robinia in deperimento, con matricinatura di farnia e rovere e con sottobosco di sanguinello e sambuco.	Si prevedono tagli a scelta con asportazione dal 25 al 30% della massa, per favorire gli esemplari più stabili. Dove è troppo diffuso, si prevede la ceduazione dell'orniello per contenerne l'eccesivo sviluppo a scapito della rinnovazione delle altre latifoglie. Sul castagno interventi di ceduazione delle ceppaie a gruppi con mantenimento degli esemplari più stabili, per mantenere la capacità pollonifera. Ripresa 50% della massa. Nel robinieto la gestione del governo misto prevede la ceduazione della robinia con rilascio delle altre latifoglie.	Verricello o avvallamento	Portaseme di cerro, rovere e ciavardello.

PARTICELLA 9

Tipo forestale	RB10B	RB10B
Tipo strutturale	GMC	SDD
Intervento	CF	CC
Priorità	M	B
% ripresa	40	40
Età	17	17
G/ha	15	17
Num. piante /ha > 5cm	1887	2109
Vol/ha (mc/ha)	94	105
Necromassa in piedi (mc/ha)	3	4
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	38	42
Ripresa totale (mc)	8	17
Superficie (ha)	0.20	0.41

MAPPALE	ETTARI
76	0.41
544	0.20
Totale complessivo	**0.61**

ETTARI		
PRIORITA'	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)	0.41	0.41
MEDIA (M)	0.20	0.20
Totale complessivo	**0.61**	**0.61**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc		
PRIORITA'	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)	17	17
MEDIA (M)	8	8
Totale complessivo	**25**	**25**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Rabengo sud	P	9	Alta Val Gisverga	Privato	0,61	Alta Val Gisverga presso vigneti di crinale	Robinieto di invasione su ex vigneto, con presenza di olmo e altre latifoglie mesofile. Popolamento collassato nella parte in pendenza, si presenta invece come un governo misto nella porzione più in piano, verso i vigneti. Già ceduato circa 18 anni fa.	Gestione del governo misto con ceduazione della robinia a favore delle altre latifoglie mesofile. Asportazione di circa il 40% della massa. Asportazione della robinia collassata e di parte della necromassa.	Trattore	Presenza POZZO interrato poco visibile, nella porzione pianeggiante.

PARTICELLA 10

Tipo forestale	QV51X	CE20D	CA40A	QV51A	RB10B
Tipo strutturale	FDI	FDI	GME	GMF	GMI
Intervento	SC	NG	CF	NG	NG
Priorità	M	N	T	N	N
% ripresa	25		50		
Età	70	40-100	47		
G/ha	27		30		
Num. piante /ha > 5cm	1027		1010		
Vol/ha (mc/ha)	277		261		
Necromassa in piedi (mc/ha)	49		53		
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	69		130		
Ripresa totale (mc)	50		171		
Superficie (ha)	0.73	0.58	1.31	1.05	0.70

MAPPALE	ETTARI
150	0.08
151	3.94
489	0.36
Totale complessivo	**4.38**

ETTARI						
PRIORITA'	CA40A	CE20D	QV51A	QV51X	RB10B	Totale complessivo
MEDIA (M)				0.73		0.73
INDIFFERENTE (T)	1.31					1.31
NESSUNA (N)		0.58	1.05		0.70	2.34
Totale complessivo	**1.31**	**0.58**	**1.05**	**0.73**	**0.70**	**4.38**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc						
PRIORITA'	CA40A	CE20D	QV51A	QV51X	RB10B	Totale complessivo
MEDIA (M)				50		50
INDIFFERENTE (T)	171					171
NESSUNA (N)						
Totale complessivo	**171**			**50**		**221**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio nord	N	10	Cascina Monfalcone est	Eredi Incisa della Rocchetta Giovanni	4,38	Sant'Emiliano – Cascina Monfalcone	Fustaia di cerro con acero campestre, orniello e rovere. Sta infiltrandosi la robinia che risale dal fondovalle. La struttura è irregolare con grossi diametri di quercia e acero campestre, ma anche di orniello. Il castagneto di medio versante in esposizione nord è un ceduo invecchiato con qualche matricina sempre di castagno. Si presenta deperiente. Il querceto di rovere lungo la strada asfaltata di crinale si presenta come un governo misto a prevalenza di fustaia con ceduo di castagno. A valle delle vigne è presente un ceduo invecchiato di robinia con latifoglie mesofile in cui non si prevedono interventi per lasciar invecchiare il popolamento e favorire le latifoglie già insediate.	Non si prevedono interventi nell'arco dei prossimi 15 anni. In futuro potrà essere effettuato un taglio a scelta per favorire le piante più stabili e la rinnovazione affermata. Sul castagno, trasformazione in governo misto con taglio del ceduo con rilascio degli esemplari più stabili e di gruppi di polloni vitali. Nessun intervento sul querceto di rovere e nel robinieto. Per quest'ultimo si prevede l'invecchiamento del popolamento principale per favorire lo sviluppo delle altre latifoglie presenti e l'ingresso di altra rinnovazione autoctona.	Verricello	Unica cerreta del parco di discreta estensione con presenza di grossi aceri campestri. Portaseme di cerro e acero campestre. Individuato *Crataegus oxyacantha.*

PARTICELLA 11

Tipo forestale	RB10B
Tipo strutturale	GME
Intervento	CF
Priorità	T
% ripresa	50
Età	35
G/ha	15
Num. piante /ha > 5cm	1676
Vol/ha (mc/ha)	108
Necromassa in piedi (mc/ha)	42
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	54
Ripresa totale (mc)	32
Superficie (ha)	0.60

MAPPALE	ETTARI
103	0.16
104	0.09
105	0.08
106	0.09
107	0.08
108	0.10
Totale complessivo	**0.60**

ETTARI		
PRIORITA'	RB10B	Totale complessivo
INDIFFERENTE (T)	0.60	0.60
Totale complessivo	**0.60**	**0.60**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc		
PRIORITA'	RB10B	Totale complessivo
INDIFFERENTE (T)	32	32
Totale complessivo	**32**	**32**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio nord	P	11	Sant'Emiliano	Privati	0,60	Sant'Emiliano	A valle delle vigne, sulla scarpata che arriva al fondovalle di confine, è presente un bosco misto di robinia di età circa 35 anni con latifoglie mesofile.	Si prevede la gestione a governo misto favorendo lo sviluppo delle latifoglie diverse dalla robinia e l'ingresso di altra rinnovazione autoctona. Ripresa circa 50% della massa.	Verricello	

PARTICELLA 12

Tipo forestale	RB10B
Tipo strutturale	GME
Intervento	CF
Priorità	T
% ripresa	50
Età	23
G/ha	17
Num. piante /ha > 5cm	1252
Vol/ha (mc/ha)	126
Necromassa in piedi (mc/ha)	38
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	63
Ripresa totale (mc)	35
Superficie (ha)	0.55

MAPPALE	ETTARI
143	0.01
144	0.10
146	0.13
389	0.11
390	0.21
Totale complessivo	**0.55**

ETTARI		
PRIORITA'	RB10B	Totale complessivo
INDIFFERENTE (T)	0.55	0.55
Totale complessivo	**0.55**	**0.55**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc		
PRIORITA'	RB10B	Totale complessivo
INDIFFERENTE (T)	35	35
Totale complessivo	**35**	**35**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio nord	P	12	Sant'Emiliano	Privati	0,55	a sud di Sant'Emiliano	Robinieto con latifoglie mesofile su scarpata acclive che fa da confine nord del Parco. Presente pista in fondovalle utile all'esbosco. Età del popolamento circa 23 anni. Struttura a governo misto equilibrato.	Si prevede la gestione a governo misto favorendo lo sviluppo delle latifoglie diverse dalla robinia e l'ingresso di altra rinnovazione autoctona. Ripresa circa 50% della massa.	Avvallamento	Ciavardelli di piccole dimensioni, di cui uno individuato come portaseme.

PARTICELLA 13

Tipo forestale	QC42X
Tipo strutturale	FDI
Intervento	CC
Priorità	T
% ripresa	10
Età	115
G/ha	14
Num. piante /ha > 5cm	157
Vol/ha (mc/ha)	159
Necromassa in piedi (mc/ha)	0
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	16
Ripresa totale (mc)	11
Superficie (ha)	0.69

MAPPALE	ETTARI
147	0.14
152	0.41
360	0.14
Totale complessivo	**0.69**

ETTARI		
PRIORITA'	QC42X	Totale complessivo
INDIFFERENTE (T)	0.69	0.69
Totale complessivo	**0.69**	**0.69**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc		
PRIORITA'	QC42X	Totale complessivo
INDIFFERENTE (T)	11	11
Totale complessivo	**11**	**11**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio nord	F	13	Area attrezzata Bigatti	Privati, Comune	0,69	Rio Ronsinaggio	Querceto misto di farnia di fondovalle con presenza di pioppo e salice bianco lungo il rio Ronsinaggio. In parte è area attrezzata gestita con interventi per la sicurezza della fruizione, in parte è popolamento di basso versante con presenza di ontano nero nelle parti pianeggianti più umide. La struttura è una fustaia disetanea. Le farnie più vecchie superano i 100 anni di età.	Si prevedono cure colturali per mantenere il popolamento in sicurezza, eliminando gli esemplari deperienti o instabili, con una ripresa stimata del 10% della massa.	Trattore	Presenza di elementi dell'ontaneto di ontano nero nelle porzioni più umide. Un portaseme di farnia.

PARTICELLA 14f

Tipo forestale	QV51X
Tipo strutturale	FDI
Intervento	SC
Priorità	M
% ripresa	25
Età	70
G/ha	26
Num. piante /ha > 5cm	1005
Vol/ha (mc/ha)	272
Necromassa in piedi (mc/ha)	48
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	68
Ripresa totale (mc)	25
Superficie (ha)	0.36

MAPPALE	ETTARI
377	0.36
Totale complessivo	**0.36**

ETTARI		
PRIORITA'	QV51X	Totale complessivo
MEDIA (M)	0.36	0.36
Totale complessivo	**0.36**	**0.36**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc		
PRIORITA'	QV51X	Totale complessivo
MEDIA (M)	25	25
Totale complessivo	**25**	**25**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio nord	F	14f	Bosco delle Fate	Eredi Incisa della Rocchetta Maria in Beraudo di Pralormo	0,36	Crinale sentiero bosco delle Fate	Fustaia di rovere di crinale a struttura irregolare, da poco interessata da tagli per la messa in sicurezza dell'area fruita. Rimangono alcuni esemplari deperienti da eliminare con i futuri interventi.	Nonostante i tagli appena effettuati per la messa in sicurezza, sono ancora presenti esemplari deperienti da tenere sotto controllo. Si prevedono quindi tagli a scelta colturale con prelievo del 25% della massa e rilascio dei candidati più stabili e vigorosi e liberazione della rinnovazione affermata esistente.	Trattore e verricello	

PARTICELLA 14n

Tipo forestale	QV51X	QV51X	QV51X	QC42X	CA40A	CA40X
Tipo strutturale	FDI	FDI	FMM	FDI	GME	CCI
Intervento	SC	SC	SC	CC	CF	CF
Priorità	M	B	M	T	T	B
% ripresa	25	25	25	10	50	50
Età	70	70	70	115	47	47
G/ha	28	33	31	17	30	31
Num. piante /ha > 5cm	1081	269	249	190	1010	1031
Vol/ha (mc/ha)	291	385	356	192	260	265
Necromassa in piedi (mc/ha)	52	0	0	0	53	54
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	73	96	89	19	130	133
Ripresa totale (mc)	221	158	47	49	107	144
Superficie (ha)	3.03	1.65	0.53	2.59	0.83	1.08

MAPPALE	ETTARI
377	9.71
Totale complessivo	**9.71**

ETTARI					
PRIORITA'	CA40A	CA40X	QC42X	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)		1.08		1.65	2.73
MEDIA (M)				3.57	3.57
INDIFFERENTE (T)	0.83		2.59		3.42
Totale complessivo	**0.83**	**1.08**	**2.59**	**5.21**	**9.71**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc					
PRIORITA'	CA40A	CA40X	QC42X	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)		144		158	302
MEDIA (M)				269	269
INDIFFERENTE (T)	107		49		157
Totale complessivo	**107**	**144**	**49**	**427**	**728**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio nord	N	14n	Sentiero Natura	Eredi Incisa della Rocchetta Maria in Beraudo di Pralormo	9,71	tra Val du Tupin e Val du Ge'	Fustaia disetanea di rovere sui versanti nord e sud del crinale del sentiero Natura. Nella porzione di testa della Val du Ge' compare anche il cerro nello strato dominante. Età principale dei popolamenti circa 70 anni. Nelle porzioni inferiori dei versanti sono presenti querceti di farnia a struttura irregolare con strato ceduo di carpino e localmente portaseme di tiglio cordato e acero campestre. Sul versante in esposizione nord della Val du Tupin è presente un castagneto ceduo invecchiato e deperiente. Un castagneto con rovere e struttura a governo misto equilibrato è presente sul versante nord del sentiero Natura.	Sui querceti di rovere si prevedono tagli a scelta con ripresa del 25% sulla massa. Sui popolamenti di farnia si prevedono solo cure colturali con asportazione del 10% della massa per aiutare la rinnovazione affermata. Castagneti: gestione del governo misto con ringiovanimento delle ceppaie, mantenimento degli esemplari più stabili, anche a gruppi, e salvaguardia della rovere e delle altre latifoglie sporadiche.	Trattore e verricello	Cavità picidi e nidi negli esemplari più vecchi. Portaseme di tiglio e farnia.

PARTICELLA 15

Tipo forestale	QC42B
Tipo strutturale	FDI
Intervento	CC
Priorità	T
% ripresa	10
Età	80
G/ha	17
Num. piante /ha > 5cm	339
Vol/ha (mc/ha)	198
Necromassa in piedi (mc/ha)	0
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	20
Ripresa totale (mc)	17
Superficie (ha)	0.88

MAPPALE	ETTARI
153	0.18
154	0.25
155	0.15
156	0.13
355	0.17
Totale complessivo	**0.88**

ETTARI		
PRIORITA'	QC42B	Totale complessivo
INDIFFERENTE (T)	0.88	0.88
Totale complessivo	**0.88**	**0.88**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc		
PRIORITA'	QC42B	Totale complessivo
INDIFFERENTE (T)	17	17
Totale complessivo	**17**	**17**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio nord	P	15	pista lungo Ronsinaggio	Privati	0,88	versante est sotto il Bosco delle Fate	Querceto di farnia con grandi esemplari maturi e piano inferiore a nocciolo e olmo. Sono presenti aree dove schianti o tagli pregressi hanno favorito il nocciolo a scapito delle querce e delle altre latifoglie mesofile.	Cure colturali per favorire la rinnovazione nelle aree aperte, con ceduazione delle ceppaie di nocciolo. Eventuali tagli per messa in sicurezza della pista di fondovalle.	Verricello o avvallamento	

PARTICELLA 16f

Tipo forestale	QV51X	QV51X
Tipo strutturale	FMA	FDI
Intervento	DR	SC
Priorità	T	M
% ripresa	25	25
Età	41	70
G/ha	25	26
Num. piante /ha > 5cm	399	1005
Vol/ha (mc/ha)	273	271
Necromassa in piedi (mc/ha)	0	48
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	68	68
Ripresa totale (mc)	28	11
Superficie (ha)	0.41	0.16

MAPPALE	ETTARI
378	0.57
Totale complessivo	**0.57**

ETTARI		
PRIORITA'	QV51X	Totale complessivo
MEDIA (M)	0.16	0.16
INDIFFERENTE (T)	0.41	0.41
Totale complessivo	**0.57**	**0.57**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc		
PRIORITA'	QV51X	Totale complessivo
MEDIA (M)	11	11
INDIFFERENTE (T)	28	28
Totale complessivo	**39**	**39**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio nord	F	16f	crinale Bosco delle Fate e crinale Casa del Parco	Eredi Incisa della Rocchetta Mario	0,57	Crinale sentiero Bosco delle Fate e querceto fronte Casa del Parco	Fustaia di rovere di crinale a struttura irregolare, al Bosco delle Fate, e fustaia monoplana adulta davanti alla Casa del Parco. Entrambe le zone da poco sono state interessate da tagli per la messa in sicurezza dell'area fruita; l'area davanti alla Casa del Parco ha subito interventi di diradamento anche nel 2000. Rimangono alcuni esemplari deperienti da eliminare con i prossimi tagli. Nelle aree aperte presenza di rinnovazione affermata, sia di rovere sia di orniello.	Nonostante i tagli appena effettuati per la messa in sicurezza, sono ancora presenti esemplari deperienti da tenere sotto controllo. Si prevedono quindi tagli a scelta colturale o diradamenti con prelievo del 25% della massa e rilascio dei candidati più stabili e vigorosi e liberazione della rinnovazione affermata esistente.	Trattore e verricello	

PARTICELLA 16n

Tipo forestale	CA40E	QV51X	CA40X	QV51X	QV51X	QC42X
Tipo strutturale	GMI	FMA	GMI	FDI	FMM	FDI
Intervento	DR	DR	CF	SC	SC	CC
Priorità	B	T	N	M	M	T
% ripresa	40	25	40	25	25	10
Età	70	41	45	70	70	115
G/ha	35	25	0	26	34	18
Num. piante /ha > 5cm	1083	399	0	1005	277	195
Vol/ha (mc/ha)	300	273	0	271	397	197
Necromassa in piedi (mc/ha)	24	0	0	48	0	0
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	119	68	0	68	99	20
Ripresa totale (mc)	17	67	0	56	205	35
Superficie (ha)	0.14	0.99	1.93	0.82	2.07	1.75

MAPPALE	ETTARI
378	7.71
Totale complessivo	**7.71**

ETTARI					
PRIORITA'	CA40E	CA40X	QC42X	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)	0.14				0.14
MEDIA (M)				2.89	2.89
INDIFFERENTE (T)			1.75	0.99	2.74
NESSUNA (N)		1.93			1.93
Totale complessivo	**0.14**	**1.93**	**1.75**	**3.88**	**7.71**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc					
PRIORITA'	CA40E	CA40X	QC42X	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)	17				17
MEDIA (M)				261	261
INDIFFERENTE (T)			35	67	102
NESSUNA (N)					
Totale complessivo	**17**		**35**	**328**	**380**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio nord	N	16n	area Bosco delle Fate - Casa del Parco	Eredi Incisa della Rocchetta Mario	7,71	area tra il Bosco delle Fate e la Casa del Parco	Fustaia disetanea di rovere sula parte alta dei versanti. Età principale dei popolamenti circa 70 anni. Nelle porzioni inferiori dei versanti sono presenti querceti di farnia a struttura irregolare con strato ceduo di carpino. Sul versante in esposizione nord sotto la Casa del Parco è presente un castagneto ceduo invecchiato e deperiente diradato circa 15-18 anni fa. Il popolamento è quasi puro ed abbastanza stabile nonostante la forte diffusione del cancro corticale e del cinipide galligeno.	Sui querceti di rovere si prevedono tagli a scelta con ripresa del 25% sulla massa. Sui popolamenti di farnia si prevedono solo cure colturali con asportazione del 10% della massa per aiutare la rinnovazione affermata. Castagneti: gestione del governo misto e diradamenti con ringiovanimento delle ceppaie, mantenimento degli esemplari più stabili e salvaguardia della rovere e delle altre latifoglie sporadiche. Apertura di buche per favorire la rinnovazione di castagno dalle ceppaie più vitali. Prelievo previsto del 40% sulla massa.	Trattore e verricello	Rinnovazione affermata di faggio sul versante del Grande Faggio in Val du Ge'. Portaseme di faggio, cerro, farnia, tiglio.

PARTICELLA 17

Tipo forestale	CA40E	CA40X	QV51X	QV51X	QC42X	BS31X
Tipo strutturale	GMI	GMI	FMA	FMM	FDI	FDI
Intervento	DR	CF	DR	SC	CC	CC
Priorità	B	N	T	M	T	T
% ripresa	40	40	25	25	10	20
Età			41	70	115	35
G/ha	34	0	23	31	17	14
Num. piante /ha > 5cm	1061	0	367	255	190	893
Vol/ha (mc/ha)	291	0	252	363	190	95
Necromassa in piedi (mc/ha)	24	0	0	0	0	7
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	116	0	63	91	19	19
Ripresa totale (mc)	111	0	37	20	7	7
Superficie (ha)	0.96	0.06	0.58	0.22	0.37	0.36

MAPPALE	ETTARI
161	0.13
164	0.15
165	0.53
166	0.28
167	0.31
168	0.49
380	0.29
400	0.28
494	0.07
Totale complessivo	**2.54**

ETTARI						
PRIORITA'	BS31X	CA40E	CA40X	QC42X	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)		0.96				0.96
MEDIA (M)					0.22	0.22
INDIFFERENTE (T)	0.36			0.37	0.58	1.31
NESSUNA (N)			0.06			0.06
Totale complessivo	**0.36**	**0.96**	**0.06**	**0.37**	**0.80**	**2.54**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc						
PRIORITA'	BS31X	CA40E	CA40X	QC42X	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)		111				111
MEDIA (M)					20	20
INDIFFERENTE (T)	7			7	37	50
NESSUNA (N)						
Totale complessivo	**7**	**111**		**7**	**56**	**181**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio nord	P	17	sentiero Casa del Parco	Privati	2,54	Cascina Malacarne e versante a nord del sentiero Casa del Parco	Castagneto invecchiato con robinia e altre latifoglie tra cui tiglio acero campestre e carpino. Struttura a governo misto. Fustaia monoplana adulta di rovere sulla parte alta del crinale che scende alla Casa del Parco. Presenza di cerro nella parte verso l'asfaltata. Presenti alcuni esemplari deperienti. Nelle aree aperte o di schianti presenza di rinnovazione affermata, sia di rovere sia di orniello. Nella parte inferiore del versante è presente un querceto di farnia a struttura irregolare con strato ceduo di carpino. Boscaglia collinare di invasione su ex vigneti con presenza di olmo e ciliegio.	Castagneto: gestione del governo misto con diradamento delle ceppaie ed eliminazione della robinia morta e dei castagni instabili. Liberazione delle latifoglie mesofile già affermate e in rinnovazione. Ripresa del 40%. Sulla rovere si prevedono tagli a scelta colturale o diradamenti con prelievo del 25% della massa e rilascio dei candidati più stabili e vigorosi e liberazione della rinnovazione affermata esistente anche con creazione di buche. Sui popolamenti di farnia si prevedono solo cure colturali con asportazione del 10% della massa per aiutare la rinnovazione affermata. Sulla boscaglia di invasione si prevedono cure colturali con asportazione del 20% della massa.	Trattore o verricello	Cavità picidi su alberi deperienti o morti in piedi. Portaseme di tiglio, rovere, ciliegio e un olmo glabro.

PARTICELLA 18

Tipo forestale	BS40X	QV51X	QV51X	QV51X	QC42X	QC42X	BS31X	RB10B
Tipo strutturale	CCA	FMP	FMP	0	FDI	FMM	FNO	CCG
Intervento	CC	DR	DR	0	CC	CC	NG	NG
Priorità	B	M	M	T	T	T	N	N
% ripresa	15	30	25	25	10	10		
Età	40-80	32	27	27	80	80		
G/ha	22	18	23	23	18	20		
Num. piante /ha > 5cm	1023	765	973	994	349	380		
Vol/ha (mc/ha)	145	142	187	190	213	223		
Necromassa in piedi (mc/ha)	13	6	15	15	0	0		
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	21	42	47	48	20	22		
Ripresa totale (mc)	5	50	6	88	1	14		
Superficie (ha)	0.24	1.18	0.12	1.85	0.03	0.62	0.69	0.33

MAPPALE	ETTARI
179	0.25
180	0.09
181	0.11
184	0.10
185	0.08
186	0.07
188	0.02
189	0.07
190	0.02
191	0.20
192	0.14
193	0.11
194	0.18
195	0.33
196	0.03
197	0.69
198	0.03
199	0.05
200	0.16
201	0.10
202	0.23
203	0.36
401	0.17
402	0.17
497	0.39
498	0.12
499	0.07
500	0.09
501	0.05
502	0.10
503	0.32
504	0.15
Totale complessivo	**5.06**

ETTARI						
PRIORITA'	BS31X	BS40X	QC42X	QV51X	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)		0.24				0.24
MEDIA (M)				1.30		1.30
INDIFFERENTE (T)			0.65	1.85		2.50
NESSUNA (N)	0.69				0.33	1.02
Totale complessivo	**0.69**	**0.24**	**0.65**	**3.15**	**0.33**	**5.06**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc						
PRIORITA'	BS31X	BS40X	QC42X	QV51X	RB10B	Totale complessivo
BREVE (B)		5				5
MEDIA (M)				55		55
INDIFFERENTE (T)			14	88		103
NESSUNA (N)						
Totale complessivo		**5**	**14**	**144**		**163**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio sud	P	18	Casa del Parco	Privati, Ente Parco	5,06	Cascina Valbenenta- Casa del Parco	Querceti di rovere di invasione su ex coltivi o prati, con età variabile 10-40 anni, a prevalenza di diametri piccoli. Presente robinieto giovane verso la fine del sentiero della Casa del Parco, appena ceduato. All'altezza della curva del sentiero è presente un novelleto di boscaglia di invasione su sottobosco impenetrabile di rovo, probabilmente creatosi dopo un taglio eccessivamente forte. La parte bassa della scarpata sul Ronsinaggio è interessata parzialmente da un querco-carpineto con grandi esemplari maturi e sottobosco a nocciolo, ed in parte da un corileto sviluppato a scapito del querceto di farnia dopo tagli pregressi che non ne hanno favorito la rinnovazione.	Diradamenti sul querceto di rovere per liberare candidati stabili e per creare piccole radure e chiarie con eliminazione della copertura arboreo-arbustiva e ritorno al prato stabile (da mantenere artificialmente, altrimenti si richiudono). Non ceduare la robinia ma lasciarla all'invecchiamento naturale. Nessun intervento nel robinieto giovane e nella boscaglia di invasione. Nel querceto di farnia e nel corileto di fondovalle si prevedono solo cure colturali con una ripresa del 10-15% della massa, cercando di favorire la rinnovazione presente, anche formando piccole aperture.	Trattore e verricello	

PARTICELLA 19

Tipo forestale	QV51X	QV51X	QV51X	QC42X	QV51X	QV51X	QV51X
Tipo strutturale	FGI	FDI	FMP	FDI	FMP	FMP	FMP
Intervento	SC	SC	DR	CC	DR	DR	DR
Priorità	N	M	M	T	D	M	M
% ripresa		25	25	10	30	30	40
Età	80	100	32	100	32	32	17
G/ha		24	22	15	15	18	25
Num. piante /ha > 5cm		679	623	1310	639	776	1588
Vol/ha (mc/ha)		270	251	115	119	143	168
Necromassa in piedi (mc/ha)		30	28	9	5	6	4
Ripresa ad ettaro (mc/ha)		68	62	12	35	43	67
Ripresa totale (mc)		191	9	14	11	64	50
Superficie (ha)	2.10	2.83	0.15	1.14	0.31	1.49	0.75

MAPPALE	ETTARI
170	4.46
171	1.16
174	0.23
175	0.10
176	0.75
177	0.14
178	0.17
257	0.04
363	0.75
364	0.15
365	0.19
505	0.04
507	0.34
508	0.22
509	0.02
Totale complessivo	**8.77**

ETTARI			
PRIORITA'	QC42X	QV51X	Totale complessivo
MEDIA (M)		5.21	5.21
DIFFERIBILE (D)		0.31	0.31
INDIFFERENTE (T)	1.14		1.14
NESSUNA (N)		2.10	2.10
Totale complessivo	**1.14**	**7.63**	**8.77**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc			
PRIORITA'	QC42X	QV51X	Totale complessivo
MEDIA (M)		315	315
DIFFERIBILE (D)		11	11
INDIFFERENTE (T)	14		14
NESSUNA (N)		0	0
Totale complessivo	**14**	**325**	**339**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio sud	N	19	Cascina Vignale	Incisa della Rocchetta Mario e Agnese, privati (257)	8,77	Cascina Vignale	Querceti di rovere dal crinale fino al fondovalle dove lasciano il posto ad una stretta fascia di farnia. Si presentano generalmente come giovani fustaie monoplane (20-30 anni), nell'area tra C.na Vignale e Casa Parco, o fustaie irregolari (80-100 anni), tra l'asfaltata e C.na Vignale sulla testata della Val d' Nenta. Si tratta di fustaie di rovere con piano inferiore di orniello. I popolamenti più vecchi sono in fase di deperimento ed è presente molta necromassa. Quelli giovani sono originati da invasione su ex prati o coltivi e si auspica un ritorno al prato. Nel fondovalle il querco-carpineto presenta piante mature di farnia (oltre 100 anni), e scarsa copertura di carpino e farnie di dimensioni intermedie nel piano dominato. Il sottobosco è composto da nocciolo e sambuco.	Diradamenti sul querceto giovane di rovere per liberare candidati stabili e per creare piccole radure e chiarie con eliminazione della copertura arboreo-arbustiva e ritorno al prato stabile (da mantenere artificialmente, altrimenti si richiudono). Non ceduare la robinia ma lasciarla all'invecchiamento naturale. Nel querceto di farnia di fondovalle si prevedono solo cure colturali con una ripresa del 10% della massa, cercando di favorire la rinnovazione presente.	Trattore e verricello	**In difformità al Regolamento Forestale, nelle aree di ex prato/coltivo, si auspica la trasformazione/creazione di aree aperte a prato, da mantenere artificialmente.** Pioppi tremoli morti e grosse farnie nel fondovalle come potenziali habitat. Individuato un portaseme di sorbo domestico lungo l'asfaltata.

PARTICELLA 20

Tipo forestale	QV51X	QC42X	QV51A	QV51A	CA40A	QC42X
Tipo strutturale	FGI	FDI	FMA	FMA	GMI	FMM
Intervento	SC	CC	DR	DR	CF	CC
Priorità	N	T	D	M	B	T
% ripresa		10	40	40	40	10
Età	80	100	60-100	60-100	45	80
G/ha		15	31	30	29	18
Num. piante /ha > 5cm		1282	721	707	748	349
Vol/ha (mc/ha)		113	335	330	285	206
Necromassa in piedi (mc/ha)		9	9	9	9	0
Ripresa ad ettaro (mc/ha)		12	134	131	114	20
Ripresa totale (mc)		12	491	17	175	7
Superficie (ha)	0.05	0.99	3.66	0.13	1.53	0.35

MAPPALE	ETTARI
170	1.60
204	0.30
206	4.47
207	0.34
Totale complessivo	**6.72**

ETTARI					
PRIORITA'	CA40A	QC42X	QV51A	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)	1.53				1.53
MEDIA (M)			0.13		0.13
DIFFERIBILE (D)			3.66		3.66
INDIFFERENTE (T)		1.34			1.34
NESSUNA (N)				0.05	0.05
Totale complessivo	**1.53**	**1.34**	**3.80**	**0.05**	**6.72**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc					
PRIORITA'	CA40A	QC42X	QV51A	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)	175				175
MEDIA (M)			17		17
DIFFERIBILE (D)			491		491
INDIFFERENTE (T)		19			19
NESSUNA (N)				0	0
Totale complessivo	**175**	**19**	**508**	**0**	**702**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio sud	N	20	Gatti nord	Incisa della Rocchetta Mario, Oddone, Giovanni	6,72	frazione Gatti	Querceti di rovere generalmente con ceduo invecchiato di castagno nel piano dominato, età 80-100 anni. Presente anche una buona percentuale di carpino. Il popolamento attuale deriva da un taglio di conversione effettuato sul ceduo matricinato di castagno che ormai sta velocemente deperendo. Presenti porzioni di castagneto ceduo invecchiato con matricinatura di rovere, oggetto di ceduazioni pregresse. Nel fondovalle il querco-carpineto presenta piante mature di farnia (oltre 100 anni), e scarsa copertura di carpino e farnie di dimensioni intermedie nel piano dominato. Il sottobosco è composto da nocciolo e sambuco.	Nel querceto di rovere si prevedono diradamenti irregolari per migliorare la struttura e per favorire gli esemplari con chioma più aperta. Mantenere il carpino e gli esemplari di castagno più stabili. Nel querceto di farnia di fondovalle si prevedono solo cure colturali con una ripresa del 10% della massa, cercando di favorire la rinnovazione presente. Nel castagneto: gestione a governo misto con locale apertura di buche per dare luce alle ceppaie di castagno e favorire il ricaccio, e individuazione delle piante più stabili nell'altofusto. Ripresa del 40% sulla massa.	Trattore e verricello	Presenti portaseme di rovere e di carpino nel fondovalle

PARTICELLA 21

Tipo forestale	QV51X	QV51A	CA40A
Tipo strutturale	FGI	FMA	GMI
Intervento	SC	DR	CF
Priorità	N	M	B
% ripresa		40	40
Età	80	60-100	45
G/ha		30	28
Num. piante /ha > 5cm		707	734
Vol/ha (mc/ha)		329	281
Necromassa in piedi (mc/ha)		9	9
Ripresa ad ettaro (mc/ha)		131	112
Ripresa totale (mc)		11	79
Superficie (ha)	0.15	0.08	0.70

MAPPALE	ETTARI
205	0.17
214	0.25
215	0.33
356	0.19
Totale complessivo	**0.93**

ETTARI				
PRIORITA'	CA40A	QV51A	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)	0.70			0.70
MEDIA (M)		0.08		0.08
NESSUNA (N)			0.15	0.15
Totale complessivo	**0.70**	**0.08**	**0.15**	**0.93**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc				
PRIORITA'	CA40A	QV51A	QV51X	Totale complessivo
BREVE (B)	79			79
MEDIA (M)		11		11
NESSUNA (N)			0	0
Totale complessivo	**79**	**11**	**0**	**89**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio sud	P	21	Gatti ovest	Privati	0,93	frazione Gatti	Castagneto ceduo invecchiato (45 anni) con matricinatura di rovere, oggetto di ceduazioni pregresse. Il ceduo di castagno ormai sta velocemente deperendo. Sui confini verso il crinale, maggiore presenza di rovere di età 80-100 anni.	Nel castagneto: gestione a governo misto con locale apertura di buche per dare luce alle ceppaie di castagno e favorire il ricaccio, e individuazione delle piante più stabili nell'altofusto. Nel querceto di rovere: interventi di taglio a scelta sugli esemplari meno stabili. Ripresa del 40% sulla massa, soprattutto a carico del castagno.	Trattore e verricello	

PARTICELLA 22

Tipo forestale	QC42X	RB10B	RB10X	QC42X	RI10B	RI10D	QC60B	QC42X	RB10X
Tipo strutturale	FDI	CCG	CCA	FMM	FMA	FMA	FDI	FDI	CCG
Intervento	SC	CF	CF	CC	TR	DR	SC	SC	NG
Priorità	T	D	T	T	T	D	D	D	N
% ripresa	25	50	50	10	80	80	25	25	
Età	75-100	20	20	80	40	40	50	50	
G/ha	19	19	19	19	23	23	16	14	
Num. piante /ha > 5cm	226	1597	1597	369	600	600	808	440	
Vol/ha (mc/ha)	203	136	137	213	281	282	123	127	
Necromassa in piedi (mc/ha)	5	4	4	0	20	20	5	3	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	51	68	68	22	224	224	31	32	
Ripresa totale (mc)	54	70	18	5	114	60	47	12	
Superficie (ha)	1.05	1.03	0.27	0.22	0.51	0.27	1.52	0.39	0.75

MAPPALE	ETTARI
208	0.19
209	0.21
210	0.46
211	0.25
212	0.30
241	0.12
242	0.20
252	0.13
254	0.14
255	0.08
256	0.54
340	0.39
370	0.20
396	0.85
397	0.60
398	0.17
438	0.04
512	0.11
517	0.78
518	0.26
Totale complessivo	**6.00**

ETTARI							
PRIORITA'	QC42X	QC60B	RB10B	RB10X	RI10B	RI10D	Totale complessivo
DIFFERIBILE (D)	0.39	1.52	1.03			0.27	3.20
INDIFFERENTE (T)	1.27			0.27	0.51		2.05
NESSUNA (N)				0.75			0.75
Totale complessivo	**1.66**	**1.52**	**1.03**	**1.02**	**0.51**	**0.27**	**6.00**

RIPRESA NEI 15 ANNI mc							
PRIORITA'	QC42X	QC60B	RB10B	RB10X	RI10B	RI10D	Totale complessivo
DIFFERIBILE (D)	12	47	70			60	190
INDIFFERENTE (T)	58			18	114		191
NESSUNA (N)				0			0
Totale complessivo	**71**	**47**	**70**	**18**	**114**	**60**	**380**

SETTORE	COMPRESA	PART.	NOME	PROPRIETA'	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
Ronsinaggio sud	P	22	Rio Ronsinaggio, Val d' Nenta - Fonte Canà	Privati	6,00	tra Val d' Nenta e fonte Canà, versante Ronsinaggio	Ceduo giovane di robinia a tratti con rada matricinatura di farnia e presenza di altre latifoglie mesofile. A valle dell'ultima cascina dei Gatti, è presente un rimboschimento di pino strobo con una fascia di tiglio ibrido nella parte inferiore, lungo la pista del Ronsinaggio: impianto artificiale da sostituire con specie autoctone più naturali. Giovane fustaia di querco-carpineto mesoxerofilo nella parte alta del versante della Val d' Nenta, lascia il posto al querceto misto di impluvio nelle parti più umide, più prossime al Ronsinaggio.	Nei querco-carpineti: interventi di taglio a scelta con asportazione degli esemplari meno stabili e ripresa del 25% sulla massa. Rimboschimento: sostituzione di specie con elementi autoctoni da effettuarsi in più riprese per disetaneizzare il futuro popolamento naturaliforme. Robinieti: trasformazione da ceduo a governo misto con taglio del 50% della massa di robinia e rilascio di tutte le altre latifoglie presenti. Necessario favorire la rinnovazione di specie autoctone diverse dalla robinia.	Trattore e verricello	Fonte Canà presso il confine sud del Parco.